

[4 ขั้นตอนทุเรียนนอกฤดู]

เพื่อการออกดอก (ฉบับป้องกันใบไหม้)



ขั้นตอนที่ 1 การจัดการต้นทุเรียนให้พร้อม

1. อายุของต้น
 - ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 6-12 เมตร
 - ควรมีอายุ 8-15 ปี
2. ความพร้อมของต้น
 - เจริญเติบโตดี ไม่เป็นโรค ไม่มีแมลงระบาด
3. โครงสร้างต้น
 - ขนาดกิ่งเหมาะสมต่อการติดผล
 - มีสัดส่วนของใบ ความหนาที่ใบ และจำนวนกิ่งที่เหมาะสม
4. ปริมาณอาหารสะสมของต้น
 - ควรสร้างชุดใบ 2-3 ชุด ใบสีเขียวเข้มมันดำ



ต้นสมบูรณ์ดี มีการแตกใบ 2 ชุดใบ



แตกใบดก และจำนวนใบหลายชั้น



200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่น จำนวน 2 ครั้ง ต่อชุดใบ



ใบเขียวเข้มมันดำ



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

[4 ขั้นตอนทุเรียนนอกฤดู]

เพื่อการออกดอก (ฉบับป้องกันใบไหม้)



ขั้นตอนที่ 2 การพ่นสารพาโคลบิวทราโซล

1. เน้นพ่นระยะใบเพสลาด (70 % ของสวน) รวมทั้งกิ่งอ่อนๆ
2. หลังพ่นสาร ควรปลอดฝนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3. ต้นสมบูรณ์มาก ใบใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมัน มีการแตกใบหลายชั้น และความยาวข้อระหว่างใบมาก ควรพ่นสารในอัตราความเข้มข้นสูง
4. หากมีอาการแตกใบอ่อนหลังพ่น 1-2 สัปดาห์ ต้องฉีดพ่นสารซ้ำ โดยใช้อัตราสารครึ่งหนึ่งของการใช้ปกติ
5. หากมีฝนตกลงมาภายในระยะ 2 ชั่วโมงหลังพ่น ให้พ่นสารใหม่อีกครั้ง ในอัตราเท่าเดิม

ขั้นตอนที่ 3 การสะสมอาหาร เพื่อสัดส่วน C/N เรโซที่เหมาะสม

1. หลังพ่นสารพาโคลฯ ไม่รดน้ำ และมีการจัดการน้ำเพื่อส่งใบให้แก่
2. หลังพ่นสารพาโคลฯ 7-10 วัน สามารถให้ปุ๋ยทางดินได้
3. ควรให้อาหารทางใบ (ตามขั้นตอน) เพื่อให้ปริมาณอาหารสะสมมีเพียงพอต่อการออกดอก
4. เมื่อมีการจัดการน้ำ ปุ๋ยทางดิน และอาหารทางใบ จนใบแก่จัดแล้ว ควรจัดการให้ดินที่โคนต้นมีโอกาสดึงได้เร็วขึ้น และควรตัดกิ่งแขนงภายในพุ่มให้เรียบร้อย
5. หลังใบแก่จัด ลดปริมาณน้ำ (ให้แบบโชยน้ำ) พร้อมให้อาหารทางใบ
6. หลังสะสมอาหารรอบที่ 6 หรือที่ 7 (ขึ้นอยู่กับสภาพดินและสภาพอากาศ) ให้น้ำ 7-10 วัน จึงทำการชียน้ำอีกครั้ง

สูตรคูณทำสาร ครั้งที่ 1



หลักการสะสมอาหาร (ทุเรียนสาร) รอบที่ 1-2



สูตรคูณทำสาร ครั้งที่ 2



- TIPS • ควรใช้ยามากุซิกุมิ 100 ซีซี และปุ๋ยสูตร 0-52-34 อัตรา 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อช่วยให้ใบสมบูรณ์แข็งแรง และป้องกันอาการใบไหม้
- ควรพ่นจำนวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

[4 ขั้นตอนทุเรียนนอกฤดู]

เพื่อการออกดอก (ฉบับป้องกันใบไหม้)



หลักการสะสมอาหาร (ทุเรียนสาร) รอบที่ 3-7



TIPS • ควรพ่นจำนวน 3-4 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน

ขั้นตอนที่ 4 การเปิดตาดอก และบำรุงตาดอก

1. หลังจากงดน้ำ 7-10 วัน เพื่อให้ชักนำการออกดอก โดยวิธีการชอนน้ำ
2. หลังพ่นสะสมอาหารรอบที่ 8 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความสมบูรณ์ของต้น) ประมาณ 5-7 วัน จึงให้พ่นสูตรคุณตาดอก เน้นบริเวณท้องกิ่งเป็นหลัก
3. การบำรุงดอก ให้พ่น สูตรคุณตาดอก ผสมยามากุชิภูมิ เพื่อทำให้ดอกมีความสมบูรณ์

หลักการสะสมอาหาร (ทุเรียนสาร) รอบที่ 8



TIPS • เมื่อสำรวจในทรงพุ่ม เริ่มพบระยะไข่ปลา พ่นใบให้ทั่วทรงพุ่ม โดยผสมปุ๋ยสูตร 13-0-46 อัตรา 1500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร จำนวน 1 ครั้ง

การเปิดตาดอก และบำรุงตาดอก



เทคนิคการชอนน้ำ เพื่อการออกดอกของทุเรียนสาร

ต้นทุเรียนที่ผ่านการสะสมอาหาร เพื่อสร้างสัดส่วน C/N เรโซ ที่เหมาะสมต่อการออกดอก ต้องอาศัยสภาวะเครียดเนื่องจากความชื้นในดินลดลง โดยสังเกตจาก

1. วัดค่าสภาวะน้ำภายในใบ (LEAF WATER POTENTIAL) ควรมีค่าประมาณ 8 บาร์
2. ก่อนเวลา 15.00 น. ใบแสดงอาการสลดเพียงเล็กน้อย หรือมีอาการใบตก
3. การจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อชักนำการออกดอก



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON