

6 วิกฤติ ของการแตกใบอ่อน ในทุเรียน



1

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 1

- แตกใบใหม่ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 1 เดือน
- ใช้เป็นโรงครัวที่สร้างอาหารมาเลี้ยงต้น
- ควรกระตุ้นให้แตกใบพร้อมกัน

2

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 2

- แตกใบใหม่ช่วงหลังใบชุดแรกแก่ 45 วัน
- ใช้เป็นใบสำหรับทำนอกฤดู/ต้นฤดู
- ควรระวังโรค และแมลงเข้าลาย

3

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 3

- ใบชุดสุดท้ายก่อนออกดอกในฤดู
- ทุเรียนนอกฤดู/ต้นฤดู ควรทำใบชุดที่ 3 หลังดอกเข้าระยะเหี่ยวดัดต้นหนุ และให้เข้าใบพสลาด ก่อนดอกบาน
- ใช้หลักกดใบ/ส่งใบ

4

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 4

- มักแตกหลังออกดอก จนถึงก่อนดอกบาน
- ช่วงวิกฤติหากออกตอนดอกใกล้บาน ผลร่วง
- กระตุ้นให้ใบอ่อนออก หลังดอกเข้าระยะเหี่ยวดัดต้นหนุ เร่งให้แก่ก่อนดอกบาน

5

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 5

- มักแตกใบใหม่ หลังติดผล 1-10 สัปดาห์
- เกิดการแย่งอาหารระหว่างใบอ่อนกับผลอ่อน ผลอ่อนร่วง
- หลัก ข่าใบ/กดใบ/ส่งใบ

6

วิกฤติของการแตกใบอ่อนชุดที่ 6

- แตกใบใหม่ ก่อนผลแก่ หรือก่อนการเก็บเกี่ยว (มักเจอช่วงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน)
- เจออาการเต่าพา เนื้อแกร็น หรือแข็ง
- หลักการ ส่งใบ เต็มอาหาร



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลนท์ โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON