

ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัด ไรแดงแอฟริกันทุเรียน



ไรแดงแอฟริกัน จะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ด้านหน้าใบ ทำให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลล์ ส่งผลให้ใบเหลืองซีด แท้ง บนใบจะเห็นเป็นขุยขาวๆ คล้ายฝุ่นผงอยู่บนใบ

ไรแดงแอฟริกัน ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลเข้มอาจสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ เคลื่อนไหวไปมาบนใบ ถ้าใช้แว่นขยายส่อง จะเห็นได้ชัดขึ้น และมีวงจรชีวิตประมาณ 6-7 วัน



สำหรับการป้องกันกำจัด โดยใช้สารกำจัดไร ผลการทดสอบเบื้องต้น พบว่า

ประสิทธิภาพของสารกำจัดไร ที่มีแนวโน้มที่ดี
ในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน ยาวนาน 21 วัน

สารป้องกันกำจัดไร	อัตราการใช้/ น้ำ 20 ลิตร	% ที่กำจัดได้
สไปโรมีไซเฟน 24% SC	8 CC.	77-99%
ไซฟลูมีโทเฟน 20% EC	15 CC.	86-99%
คิบูเฟนไพเรต 36% EC	3 CC.	82-98%
เอ็กซีโทอะซ็อก 2% EC	40 CC.	75-92%



plantpro
ตราคุณ



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลนที โพร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

เรียบเรียงโดย : นายนิติกรณ์ เพ็ญบัวขาว หัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัท แพลนทีโพร (ประเทศไทย) จำกัด

ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัด โรแดงแอฟริกันทุเรียน



ประสิทธิภาพของสารกำจัดโร

ที่มีแนวโน้มที่ดีในการป้องกัน

กำจัดโรแดงแอฟริกัน

ยาวนาน 14 วัน

สารป้องกันกำจัดโร	อัตราการใช้/ น้ำ 20 ลิตร	% ที่กำจัดได้
เฟนไพรอกซิมเมต 5% SC	20 CC.	78-91%

สารป้องกันกำจัดโร

อามิทรราช 20% EC

40 CC.

72-92%

ไพรีดาเบน 20% WP

15 กรัม

70-88%

อัตราการใช้/
น้ำ 20 ลิตร

% ที่กำจัดได้

ประสิทธิภาพของสารกำจัดโร

ที่มีแนวโน้มที่ดีในการป้องกัน

กำจัดโรแดงแอฟริกัน

ยาวนาน 10 วัน

ประสิทธิภาพของสารกำจัดโร

ที่มีแนวโน้มที่ดีในการป้องกัน

กำจัดโรแดงแอฟริกัน

ยาวนาน 7 วัน

สารป้องกันกำจัดโร	อัตราการใช้/ น้ำ 20 ลิตร	% ที่กำจัดได้
อะบาเมกติน 1.8% EC	20 CC.	75-85%



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลนท์ โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

เรียบเรียงโดย : นายนิติกรณ์ เพ็ญบัวขาว หัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัท แพลนท์โปร (ประเทศไทย) จำกัด