






ตรา คุณ

หายไป!


ทุเรียนหน้าร้อน เพลี้ยแป้งทุเรียน



เพลี้ยแป้ง
มาจากไหน?

- เพลี้ยแป้ง อาศัยอยู่ใต้ดินตามรากพืช (เช่น ทลั่วหัวหมู เป็นต้น) หากไม่มีพืชอาหารที่เหมาะสม
- ใช้เวลา 6-10 วันต่อการฟักไข่อยู่ในถุงท้องเพศเมีย
- ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 14 วัน
- มีวงจรชีวิตประมาณ 20-24 วัน

เพลี้ยแป้ง ทำร้ายทุเรียนอย่างไร?



ส่วนถูกทำลายแคระแกร็น



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

เพลี้ยแป้ง ทำไมระบาดหนัก?

- เพลี้ยแป้งเพศเมีย 1 ตัว ใช้เวลาภายใน 14 วัน สามารถวางไข่ได้ 600-800 ฟอง โดยสามารถ ขยายพันธุ์ 2-3 รุ่นต่อปี
- เพลี้ยแป้งมีผงสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมลำตัว (ยกเว้นตัวอ่อน) ทำหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม
- เพลี้ยแป้ง อาศัยมดแดง และมดดำ เป็นตัวช่วยคาบพาไป ส่วนต่างๆ ของพืช



เพลี้ยแป้งจะอาศัยมดในการเคลื่อนย้ายเป็นหลัก



ราดำเข้าทำลาย(เพราะเพลี้ยแป้งขับน้ำหวาน)



เสียวราคา ตกไซด์ พูบริโกครึ่งเกียจ



เพลี้ยแป้ง ทำไมดื้อยา?

- เพลี้ยแป้ง มีระบบป้องกันตัวที่ดี (ผงสีขาวคล้ายผงแป้ง ปกคลุมลำตัว(ยกเว้นตัวอ่อน) ทำหน้าที่ในการป้องกัน สิ่งแปลกปลอม
- เกษตรกรมีการใช้สารเคมีกลุ่มเดิมๆ มากกว่า 10-20 ปี หากผ่านไปเรื่อย อาจเกิดภาวะการระบาดเพิ่มขึ้น (RESURGENCE)
- เกษตรกรใช้สารเคมีไม่สลับกลุ่มยา หรือสลับกลุ่มยาไม่ถูกต้อง



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON



ทูลเรียนหน้าร้อน เพี้ยนแปงทูลเรียน



การใช้สารป้องกันกำจัด เพี้ยนแปงทูลเรียน แบบสลับ หรือหมุนเวียน (ระบายน้อย)

ชุดที่ 1 กลุ่มที่ 16	ชุดที่ 2 กลุ่มที่ 4A	ชุดที่ 3 กลุ่มที่ 1B
บูโพรเฟซิน	ไดโนทีฟูเรม	คลอไพริฟอส
	โทอะมิโทแซม	อะซีเฟต
	อะเซตามิพรีด	ไดอะซินอน
	โคลโมอะนิติน	พรีมิฟอส-เมทิล
	โทอะโคลพรีด	ไดคลอวอส
	อิมิดาโคลพรีด	ไดเมทโรเอก

ชุดที่ 1 กลุ่มที่ 29	ชุดที่ 2 กลุ่มที่ 4A	ชุดที่ 3 กลุ่มที่ 1B
ฟลอเนคาบิค	ไดโนทีฟูเรม	คลอไพริฟอส
	โทอะมิโทแซม	อะซีเฟต
	อะเซตามิพรีด	ไดอะซินอน
	โคลโมอะนิติน	พรีมิฟอส-เมทิล
	โทอะโคลพรีด	ไดคลอวอส
	อิมิดาโคลพรีด	ไดเมทโรเอก

การใช้สารป้องกันกำจัด เพี้ยนแปงทูลเรียน แบบสลับ หรือหมุนเวียน (ระบายน้อย)

สารป้องกันกำจัดเพี้ยนแปงทูลเรียน

กลุ่ม 1B	กลุ่ม 4A	กลุ่ม 9B	กลุ่ม 4C	กลุ่ม 16	กลุ่ม 29	กลุ่มสาร น้ำมัน
คลอไพริฟอส	ไดโนทีฟูเรม	ไฟโบริน	ซัลฟอกซาฟลอร์	บูโพรเฟซิน	ฟลอเนคาบิค	ไวทอยล์
อะซีเฟต	โทอะมิโทแซม					พาราฟิโตอยล์
ไดอะซินอน	อะเซตามิพรีด					
พรีมิฟอส-เมทิล	โคลโมอะนิติน					
ไดคลอวอส	โทอะโคลพรีด					
ไดเมทโรเอก	อิมิดาโคลพรีด					
ไดเมทโรเอก						

หมายเหตุ: สารป้องกันกำจัดเพี้ยนแปง กลุ่มที่ 2B และกลุ่มที่ 3A
อาจทำให้เกิดการต้านทานได้ง่าย



มดแดง หรือมดดำ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่แนะนำ!!!

- มาลาโรอน
- คาร์บาริล

หมายเหตุ: ควรกำจัดบริเวณใต้ทรงพุ่ม และกิ่ง
ลำต้นของพืช



LINE: @fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON