



plantpro
ตรา คุณ

3 ข้อสังเกต น้ำมาก หรือน้ำน้อย

ในช่วงก่อนดอกทุเรียนบาน

หลักการพิจารณาเพื่อการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
ในช่วงระยะก่อนดอกทุเรียนบาน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการผสมเกสร



ข้อสังเกตที่ 1

การจับก้านดอกมาตัด ถ้าก้านดอกหัก ไม่สามารถ
งอได้ แสดงว่า “น้ำมากเกินไป” เวลาดอกบาน
กลีบดอกจะบานแฉ่ง ปลายเกสรตัวเมียไม่โค้งงอ
ชุดเกสรตัวผู้กางออกห่างจาก
ก้านชูเกสรตัวเมีย และอับเกสรจะแตกช้า



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON

Source: ปราโมช ร่วมสุข ยศพล พลาพล สมศิริ แสงโชติ สุเทพ สหยา สุมิตรา ภู่วโรดม และอิทธิสุนทร นันทกิจ. 2561. การสร้างสวนทุเรียนมือใหม่สู่มืออาชีพ. ทางการเงินส่วนจำกัดเฟรม-อัสติน. กรุงเทพฯ. ภาควิชาการเกษตร. 2561. ไม้ผล การออกดอก ติดผล และการพัฒนาการของผล. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม.

3 ข้อสังเกต น้ำมาก หรือน้ำน้อย

ในช่วงก่อนดอกทุเรียนบาน



ข้อสังเกตที่ 2

ถ้าจับก้านดอกมาตัด สามารถงอ
จนปลายมาชนกัน แสดงว่า
“น้ำน้อยเกินไป” ดอกจะบานไม่ออก
รูปร่างช่วงดอกบาน จะเหมือนส้มไก่



ข้อสังเกตที่ 3

ถ้าจับก้านดอกมาตัดเป็นรูปตัวยู (U)
แล้วหัก แสดงว่า “น้ำพอดี”
เวลาดอกบาน ปลายเกสรตัวเมียจะ
โค้งงอขึ้น เพื่อบรรจิบละออง
เกสรตัวผู้ อับเกสรตัวผู้จะ
แตกง่าย และปลดปล่อย
ละอองเกสรได้เร็ว



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลน โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON