




สูตรขุนมะม่วงมืออาชีพ




แผนการผลิตมะม่วงนอกฤดู (ภาคเหนือตอนบน)




แผนการผลิตมะม่วงนอกฤดู (ภาคเหนือตอนล่าง)



แผนการผลิตมะม่วงนอกฤดู (ภาคตะวันออก/ภาคอีสาน)



สูตรปุ๋ยมะม่วงมืออาชีพ



สูตรคูณดองใบอ่อน ชุดที่ 1

ต่อน้ำ 200 ลิตร



Trip • ควรผสมในแหล่งขี้นกในตรอก อัตรา 2,000 กรัม หรือไก่อยู่เรีย อัตรา 1,000 กรัม เพื่อให้อยอดแตกเสมอดี 7-10 วันหลังพ่น
• สูตรคูณดองใบอ่อน ควรพ่นหลังตัดแต่งกิ่งทันที จำนวน 1 ครั้ง

สูตรคูณบำรุงใบ

ต่อน้ำ 200 ลิตร



Trip • เพื่อให้ใบมีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส และใบขยายสมบูรณ์
• ควรพ่น 2 ครั้ง (ชุดใบที่ 1 อายุ 10 วัน และ 20 วันหลังแต่งใบ)
• เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล ควรใช้ คาร์บอน ร่วมด้วย

สูตรคูณดองใบอ่อน ชุดที่ 2

ต่อน้ำ 200 ลิตร



Trip • เพื่อให้ใบมีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส และใบขยายสมบูรณ์
• ควรพ่น 2 ครั้ง (ชุดใบที่ 2 อายุ 10 วัน และ 20 วันหลังแต่งใบ)
• เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล ควรใช้ คาร์บอน ร่วมด้วย

สูตรคูณบำรุงใบ

ต่อน้ำ 200 ลิตร



Trip • เพื่อให้ใบมีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส และใบขยายสมบูรณ์
• ควรพ่น 2 ครั้ง (ชุดใบที่ 2 อายุ 10 วัน และ 20 วันหลังแต่งใบ)
• เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล ควรใช้ คาร์บอน ร่วมด้วย

เกร็ดน่ารู้ ทางดิน

- หลังตัดแต่งกิ่งเสร็จ ให้ใส่ปุ๋ยทางดินทันที (เรโซ 4.5 : 1.0 : 3.8) เช่น 15-5-20 เป็นต้น หรือ 46-0-0+25-7-7
- ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลโค หรือมูลแพะ) ควรใส่อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อต้น
- สูตรคูณล้างสาร (ชากัสโซ 1 ลิตร + 46-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร) พ่นรอบทรงพุ่ม

เกร็ดน่ารู้

- หลังการเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม ไม่ให้สูงเกิน 2 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มไม่เกิน 3 เมตร (ทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงพาลิซาย)
- ควรตัดแต่งให้เสร็จสิ้นในรอบเดียว มิฉะนั้นใบอ่อนจะแตกไม่พร้อมกัน ทำให้การจัดการยาก
- หลังตัดแต่งกิ่งเสร็จ ให้พ่นล้างต้น (ถ้ามีกัน อัตรา 400 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร)
- ควรให้น้ำสม่ำเสมอ หากไม่มีฝนตก

เกร็ดน่ารู้ การให้สารมะม่วง

- หลังชักนำการแตกใบอ่อน 2 ชุด เพื่อให้เหมาะสมต่อระยะทำสาร ควรให้ใบเข้าสู่ระยะใบพวง หรือใบเพชรลาด
- ทำความสะอาดโคนกายใต้ทรงพุ่ม
- สัตส่วนอัตราสาร 1 เมตรต่อ 10 กรัม (พันธุ์เบา) และอัตรา 1 เมตรต่อ 15 กรัม (พันธุ์หนัก) พสน้ำ 1 ลิตร
- ราคาสารพาโคลบิวทราโซล บริเวณโคนต้นจนหมด

ปริมาณสารพาโคลบิวทราโซลต่อความลัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม

ผ่านศูนย์กลาง ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	ปริมาณสารพาโคลบิวทราโซล (กรัม)		ชนิดพันธุ์	
	พันธุ์เบา ออกดอกง่าย	พันธุ์หนัก ออกดอกยาก	พันธุ์เบา	พันธุ์หนัก
3	30	45	น้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้สีทอง	แรด เขียวเสวย
4	40	60	ฟ้าลั่น	อกร่อง
5	50	75	ศรีสยาม	ทองคำ
6	60	90	โชคอนันต์	ลิ้นจี่เท่า

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 2544 การผลิตมะม่วงนอกฤดู



plantpro
ตราคุณภาพ



บริษัท แพลนท์ โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON



LINE: @ fig2937e




Youtube: แพลนท์ โปร ธรรมชาติ



Instagram: koon_plantpro

สูตรปุ๋ยมะม่วงมืออาชีพ



เกร็ดน่ารู้ หลังให้สารมะม่วง

- ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สารพาโคลบิวทราโซลแพร่กระจาย ทั่วใต้ทรงพุ่ม
- หลังราดสาร 1 เดือน ใส่ปุ๋ยทางดิน 8-24-24 หรือ 12-24-12 และให้น้ำต่อเนื่อง
- พื้นที่โคนน้ำไม่เพียงพอ ให้พ่นปุ๋ย 0-52-34 ทุกๆ 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง



การราดสารพาโคลบิวทราโซล รอบโคนต้นมะม่วง

สูตรคูณสะสมอาหาร

ต่อน้ำ 200 ลิตร



200 ซีซี.

200 ซีซี.

200 ซีซี.

- Trip**
- พ่นช่วงใบมีอายุ 13-16 สัปดาห์หลังแต่งใบอ่อน
 - ควรพ่นหลังทำสาร 2-3 ครั้ง
 - เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล ควรใช้ คาร์บอน ร่วมด้วย

สูตรคูณสะสมอาหาร(พิเศษ)

ต่อน้ำ 200 ลิตร



200 ซีซี.

200 ซีซี.

100 กรัม.

- Trip**
- พ่นช่วงใบมีอายุ 17-20 สัปดาห์หลังแต่งใบอ่อน
 - ควรพ่นทางกัน 10-14 วัน ให้พ่นจำนวน 2 ครั้ง
 - ควรผสมปุ๋ย 0-52-34 อัตรา 1,000 - 1,500 กรัม

สูตรคูณดัดดอก

ต่อน้ำ 200 ลิตร



50 ซีซี.

200 ซีซี.

200 ซีซี.

- Trip**
- พ่นปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 2,000 กรัม หรือไทโอยูเรีย อัตรา 1,000 กรัม
 - พ่นจำนวน 1 - 2 ครั้ง (ช่วงใบมีอายุ 21-24 สัปดาห์)
 - ควรพ่นยามากุชิภูมิ ร่วมด้วยเพื่อป้องกันโรคแอนแทรกโนส

เกร็ดน่ารู้ กระตุ้นดอก

- หลังราดสาร 60 วัน(พันธุ์เบา) หรือ 90-120 วัน(พันธุ์หนัก) จะเริ่มแสดงอาการพร้อมออกดอก ควรงดการให้น้ำ
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตุ่มตายอด ลักษณะเต่งโปนเด่นชัด ใบที่ปลายยอดรอบตามีสีใบเข้มใบทางหรือลู่ลงมาเข้าหาส่วนกิ่ง หากเกิดมาขยี้ เนื้อใบจะแข็งกรอบ
- มะม่วงจะแทงช่อหลังพ่น สูตรคูณดัดดอก 7-10 วัน

เกร็ดน่ารู้ พัฒนาการของดอก

- ช่อดอกจะพัฒนา และยืดยาวจนสุดภายใน 14-21 วัน ควรพ่นป้องกันเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และแอนแทรกโนส
- เมื่อระยะดอกมีความยาว 3-4 เซนติเมตร ควรพ่นสารละลายอีเทฟอน ความเข้มข้น 20 ppm เพื่อทำให้ช่อดอกมีดอกสมบูรณ์เพศมากขึ้น
- ระยะออกดอก จนถึงดอกบานใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

สูตรคูณบำรุงดอก

ต่อน้ำ 200 ลิตร



200 ซีซี.

200 ซีซี.

50-100 กรัม.

- Trip**
- พ่นตั้งแต่ระยะแทงช่อถึงภายใน 14-21 วัน
 - ควรพ่นจำนวน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
 - ควรพ่นยามากุชิภูมิ ร่วมด้วยเพื่อป้องกันโรคแอนแทรกโนส



Plantpro
ตราคุณ



บริษัท ไพลอร์ โพร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON



LINE: @ fig2937e




Youtube: ไพลอร์ โพร ตราคุณ



Instagram: koon_plantpro

สูตรปุ๋ยมะม่วงมืออาชีพ



สูตรขุนบำรุงผล (ก่อนห่อ)

ต่อน้ำ 200 ลิตร



- Trip** • พันตั้งแต่ระยะเมล็ดทั่วเขียว จนถึงระยะก่อนห่อ (40-50 วันหลังดอกบาน)
- ควรพ่นจำนวน 4-5 ครั้ง
 - ควรพ่นยามากุชิภูมิ ร่วมด้วยเพื่อป้องกันโรคแอนแทรกโนส

สูตรขุนบำรุงผล (หลังห่อ)

ต่อน้ำ 200 ลิตร



- Trip** • พันตั้งแต่ระยะหลังห่อผล (60-80 วันหลังดอกบาน) จำนวน 2-3 ครั้ง
- ควรใช้ปุ๋ยสูตร 13-0-46 อัตรา 500 กรัม พ่นร่วมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ทำกัน 7-10 วัน

สูตรขุนเพิ่มน้ำหนัก

ต่อน้ำ 200 ลิตร



- Trip** • พันตั้งแต่ระยะผลมีอายุ 80-90 วันหลังดอกบาน
- ควรพ่นจำนวน 2-3 ครั้ง
 - ควรพ่นยามากุชิภูมิ ร่วมด้วยเพื่อป้องกันโรคแอนแทรกโนส

เกร็ดน่ารู้ พัฒนาการของผล

- ดอกจะแทงร่วงหล่น และผลอ่อนเริ่มขยาย ควรใส่ปุ๋ย 15-5-20 หรือ 16-16-16
- ควรให้น้ำทีละน้อยๆ จนค่อยๆ เพิ่มมากเมื่อผลขนาดใหญ่มากขึ้น และค่อยๆ ลดลงเมื่อมะม่วงเริ่มแก่ โดยหยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน

อายุความสุกแก่ของมะม่วงพันธ์ที่สำคัญ

ชื่อพันธุ์	อายุความสุกแก่	หมายเหตุ
เขียวเสวย	110	การนับอายุเริ่มนับจากดอกบาน 50% จนถึงผลแก่
น้ำดอกไม้	100	
ฟ้าลั่น	70	
อกร่อง	90	
แรด	95	
เพชรบ้านลาด	100	
มันเดือนเก้	90	
โชคอนันต์	110	
พิมเสนมัน	95	
ลั่นงูเต่า	115	
ศรีสยาม	90	

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 2544 การผลิตมะม่วงนอกฤดู



plantpro
ตรา คุณ



บริษัท ไพพร โปรเทคโนโลยี จำกัด
@plantpro.KOON



LINE: @ fig2937e



Youtube: ไพพร โปร ตราคุณ



Instagram: koon_plantpro