


ซิงค์ไซด์ (SINK SIZE) ดอก และผลทุเรียน

ทำไมต้องลด???



คำจำกัดความ “ซิงค์ไซด์”

ซิงค์ไซด์ (SINK SIZE)

คือ ขนาด และจำนวนของซิงค์

← ทุเรียนติดผลดก ผลทุเรียนเกิดการ SINK SIZE

กรณีต้นทุเรียนมีผลอ่อนเป็นจำนวนมาก หรือมีการแตกใบอ่อน ในขณะที่ผลกำลังมีการพัฒนาการซิงค์ (ผลอ่อน และใบอ่อน) จะมีความต้องการคาร์โบไฮเดรตมากเกินกว่าที่ซอร์ส (SOURCE) จะสนองได้ เพื่อรักษาสมดุลของซอร์ส และซิงค์ ทุเรียนจะสลัดผลทิ้งโดยธรรมชาติ

คำถาม: รูปแบบใดร่วงรุนแรงมากกว่ากัน???



ความรุนแรง
การร่วงของผล

1. การร่วงของผล โดยการสลัดผลทิ้งโดยธรรมชาติ
2. การร่วงของผล หลังการตัดแต่งผล


การสลัดผลร่วงโดยธรรมชาติ มีความรุนแรงมากกว่า



LINE: @ fig2937e



บริษัท แพลนท์ โปร ประเทศไทย จำกัด
@plantpro.KOON



ปฏิบัติการเพื่อลดซิงค์ไซด์ (SINK SIZE)

ระหว่างผลทุเรียน ทำได้อย่างไร???

ปฏิบัติการเพื่อลดซิงค์ไซด์ ระหว่างผลทุเรียน

1. การตัดแต่งผล
2. การควบคุมไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อน
3. การจัดการธาตุอาหาร และพลังงานพืช

1. การตัดแต่งผล เพื่อลด SINK SIZE



การตัดแต่งผลแบบกลุ่ม เพื่อเพิ่ม SINK STRENGTH


2. การควบคุมไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อน

- ต้นทุเรียนมักมีการแตกใบอ่อน เมื่อผลอายุประมาณ 7-8 สัปดาห์หลังดอกบาน หรือหลังดอกบาน 30-40 วัน
- ต้นทุเรียนมักแตกใบอ่อน หากใบแก่บ่อย ไม่สดใส ใบ และกิ่งได้รับความเสียหายจากศัตรูทุเรียนมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบทั้งต้น
- ต้นทุเรียนมักแตกใบอ่อน หากลำต้น และระบบราก มีอาการ หรือร่องรอยของโรครากเน่าโคนเน่ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นรากและลำต้น

ผลกระทบการแตกใบอ่อนทุเรียน

แตกใบอ่อน หลังติดผล 2-4 สัปดาห์	ผลร่วง
แตกใบอ่อน หลังติดผล 5-8 สัปดาห์	รูปทรงบิดเบี้ยว
แตกใบอ่อน หลังติดผล 10-12 สัปดาห์	เนื้อแกน เต่าเผา

ผลกระทบการแตกใบอ่อน



สัญญาณการแตกใบอ่อน



ลักษณะใบที่แตกใหม่ 5-7 ใบ

สูตรคุณ ส่งใบอ่อน



300 ซีซี.



0-42-56

500-1000 กรัม



200 ซีซี.


ต่อน้ำ 200 ลิตร

พ่นระยะทางปลายของใบทุเรียน จำนวน 2 ครั้ง
ห่างกัน 7-10 วัน

3. การจัดการธาตุอาหาร เพื่อเพิ่มพลังงาน

- เมื่อผลอายุ 5-9 สัปดาห์หลังดอกบาน ให้พ่นอาหารเสริม ธาตุอาหาร และพลังงาน จำนวน 5-6 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชอร์ส

สูตรคุณ ขึ้นลูก ขยายผล



200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นจำนวน 3 ครั้ง
ห่างกัน 7-10 วัน

สูตรคุณ แบ่งพู เพิ่มน้ำหนัก



200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นจำนวน 3 ครั้ง จำนวน 7-10 วัน